

Definition av Vårdrelaterad infektion

1. Infektion som bedöms ha samband med tidigare ingrepp/behandling, oberoende av vårdform

A. Postoperativ infektion:

infektion i operationsområdet inom 30 dgr (kirurgi utan implantat) eller inom 1 år (kirurgi med implantat)

B. Övriga ingreppsrelaterad infektion:

infektion som kan relateras till tidigare eller pågående användning av kateter, kärlinfart, dränage, intubation, punktion, injektion m.fl. åtgärder som bryter eller försvagar kroppens naturliga infektionsbarriär

Vänd!



Region Uppsala

Definition av Vårdrelaterad infektion

Forts.

C. Läkemedelsrelaterad infektion:
infektion uppkommen till följd av läkemedels effekt på infektionsförsvaret (cytostatika, immunhämmare eller kortison) eller normalflora (antibiotika) tex Clostridium difficile-enterit

2. Infektion som debuterar två dygn eller mer (≥ 48 timmar) efter inskrivning inom slutenvården

3. Infektion som debuterar inom två dygn efter utskrivning från slutenvården

*Bärarskap av olika typer av smittämnen (MRSA, VRE, ESBL) utan infektionstecken skall **inte** betraktas som vårdrelaterad infektion.*

Utfärdare: Strama och Vårdhygien Region Uppsala. Utgåva 2018-12-12



Region Uppsala